



Bonimal Milchaustauscher (MAT)

FEED

Mischhinweise für die Eimerfütterung

1. Etwa 1/3 des Wassers verwenden, Anrührtemperatur: 45–50 °C
2. Milchpulver zugeben: 145–170 g für 1 Liter Tränke
3. Zügig und energisch umrühren, damit das Pulver vollständig aufgelöst wird
4. Das übrige Wasser unter Rühren hinzufügen
5. Tränketemperatur: 38–42 °C

Bonimal Mischtablette für die Eimertränke

Liter Tränke	Intensive Aufzucht 170 g MAT pro Liter Tränke	Liter Wasser	Liter Tränke	Standard Aufzucht 145 g MAT pro Liter Tränke	Liter Wasser
1	170 g	0,83 l	1	145 g	0,85 l
2	340 g	1,66 l	2	290 g	1,71 l
3	510 g	2,49 l	3	435 g	2,58 l
4	680 g	3,32 l	4	580 g	3,42 l
5	850 g	4,15 l	5	725 g	4,28 l
10	1,7 kg	8,30 l	10	1,45 kg	8,55 l
20	3,4 kg	16,60 l	20	2,9 kg	17,10 l
30	5,1 kg	24,90 l	30	4,35 kg	25,65 l
40	6,8 kg	33,20 l	40	5,8 kg	34,2 l
50	8,5 kg	41,50 l	50	7,25 kg	42,75 l

Beispiel zur Standard Aufzucht:
145 Pulver + 855 ml Wasser =
1 Liter Milch

- Füttern Sie die Kälber 2-3 Mal am Tag zur gleichen Uhrzeit
- Kälber brauchen immer frisches Wasser sowie Rau- und Kraftfutter

Futterplan für die Eimertränke

Alter	Intensive Aufzucht		Standard Aufzucht		Fütterungen pro Tag	Fütterungsempfehlung
	Pulver in g pro Liter Tränke + Wasser	Liter Tränke pro Fütterung	Pulver in g pro Liter Tränke + Wasser	Liter Tränke pro Fütterung		
Tag 1-4	Kolostrum	1,5	Kolostrum	1,5	2-4	Kolostrum unmittelbar nach der Geburt, von guter Qualität in ausreichender Menge tränken; wenn möglich 4 l innerhalb der ersten 4 h
Tag 5-7	170	1,5-2	145	1,5	2-3	Ab 5. Tag Wasser
Woche 2	170	3-3,5	145	2,5	2	Wasser, Kraftfutter
Woche 3	170	3,5-4	145	3	2	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh
Woche 4-6	170	3	145	3	2	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh
Woche 7	170	2,5	145	2,5	2	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh
Woche 8	170	2,5	145	2	2	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh
Woche 9	170	2	145	2	1-2	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh
Woche 10	170	2	145	2	1	Wasser, Kraftfutter, Heu/Stroh

Die Tränke wird nach obenstehender Bonimal Mischtablette angerührt.

Fütterungshinweise und Empfehlungen

- MAT nach der **Bonimal** Mischtablette anrühren → zu geringe Konzentrationen führen zu einem Energiemangel
- MAT bei 45–50 °C anrühren → wird der MAT zu kalt angerührt, lösen sich einzelne Bestandteile nicht optimal auf
- MAT bei 38–42 °C tränken → stimmt die Tränketemperatur nicht, kann es zu Durchfällen kommen
- Ab dem 5. Tag Wasser und Kraftfutter füttern → so können sich Kälber zu leistungsstarken Wiederkäuern entwickeln

Tipps

- Bei Eisen- und Vitaminmangel, ergänzen Sie die Milch mit **Bonimal** VET EisenFit (10 g/Kalb zur Vollmilch) statt der Milchtränke für 1-2 Tage oder prophylaktisch 1 mal täglich zusätzlich
- Verwenden Sie **Bonimal** VET DiaCare bei Verdauungsproblemen oder Durchfall
- Setzen Sie **Bonimal** FEED RB Milch MM Acid oder **Bonimal** VET MilchStabil zum Ansäuern der Milch bei einem ad-libitum Tränkemanagement ein
- Bei Stresssituationen und Veränderungen, verwenden Sie **Bonimal** VET Elektrolyt für die schnelle Energieversorgung und eine gute Elektrolyt-Bilanz (50 g/l auf 2 Liter Tränke zwischen den Mahlzeiten)

Mischhinweise für die Automatentränke

Gewünschte Trockensubstanz (in % pro Liter Tränke)	Gewünschte Konzentration (in % pro Liter Tränke)	Einstellung Konzentrationsplan Tränkeautomat (in g pro Liter Wasser)
12	120 g in einem Liter Tränke	136 g auf einen Liter Wasser
12,5	125 g in einem Liter Tränke	143 g auf einen Liter Wasser
13	130 g in einem Liter Tränke	149 g auf einen Liter Wasser
14	140 g in einem Liter Tränke	163 g auf einen Liter Wasser
15	150 g in einem Liter Tränke	176 g auf einen Liter Wasser