Körnererbsen

Körnererbse

Standortansprüche:
- Gut versorgte, leichte Böden
- pH-Wert: 6,2–7,0

Aussaatzeitpunkt: Sommerkörnererbse
Anfang bis Mitte März

Winterkörnererbse
Ende September bis Ende Oktober

Fruchtfolge:
- Anbaupausen von 5–6 Jahren zu Erbsen, idealerweise Rotation der Körnerleguminosen in der Fruchtfolge
- Getreide, Mais und Hackfrüchte sind geeignete Vorfrüchte

Feroe auch in Öko
Wintererbse
- ✓ Überdurchschnittliche Korn- und Proteinerträge
- ✓ Beste Standfestigkeit
- ✓ Sicheres Wachstum und Erntequalität durch gesunde Pflanzen

Orchestra auch in Öko
Sommererbse
- ✓ Starke Kombi aus Ertrag und Rohprotein
- ✓ Frohwüchsig und standfest
- ✓ Sehr gut druschfähig
- ✓ Gute Unkrautunterdrückung
- ✓ Beste Eignung für den Öko-Anbau

Astronaute Sommererbse
- ✓ Überragende LSV-Sorte
- ✓ Sehr gute Standfestigkeit
- ✓ Hohe Ertragssicherheit
- ✓ Zügige Jugendentwicklung

Cosmos Sommererbse
- ✓ Gigantische Protein- und Kornerträge für höchste Wirtschaftlichkeit

Iconic Sommererbse
- ✓ Sehr hohes Leistungspotential im Kornertrag
- ✓ Hohe Pflanzengröße mit guter Standfestigkeit
- ✓ Sehr gute Erntequalität

Sorte	Kornfarbe	Blühbeginn	Blühdauer	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	TKM	Kornertrag	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt
Feroe auch in Öko	2	4	5	4	5	4	4	–	–	–
Orchestra auch in Öko	2	4	5	4	6	3	6	8	9	6
Astronaute	2	4	5	4	6	3	6	9	9	6
Cosmos	2	4	5	4	7	3	6	9	9	6
Iconic	2	5	4	4	7	3	6	9	9	6

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025 Deutschland

Jetzt unser Leguminosen-angebot im Shop entdecken unter baywa-landwirtschaft.de

Bei Fragen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner vor Ort oder das zentrale Produktmanagement gerne zur Verfügung.

Victoria Lechner
Produktmanagerin
E-Mail Victoria.Lechner@baywa.de
Telefon +49 89 92223114

Evi Probst
Ansprechpartnerin Verfügbarkeiten
E-Mail Evgenija.Probst@baywa.de
Telefon +49 89 92223337

BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München

baywa-landwirtschaft.de

Hinweis: Diese Druckschrift inklusive aller enthaltenen Informationen welcher Art auch immer dient rein der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Reproduzierbarkeit. Die BayWa AG übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte. Dargestellte Eigenschaften, Daten und Grafiken geben unverbindlich Erkenntnisse aus Wertprüfungen, Landessortenversuchen und Eigenversuchen wieder. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne entsprechende Einwilligung der BayWa AG weder ganz noch in Einzelteilen in irgendeiner Form genutzt oder verändert werden, es sei denn es ist urheberrechtlich zulässig.

Stand Oktober 2025

BayWa

Leguminosen – Die Allrounder auf dem Acker

Unsere Highlight-Sorten für 2026

Für die Landwirtschaft.

Sojabohnen – unsere Highlight-Sorten

Sojabohne*

Standortansprüche:
- Leicht erwärmbare Böden
- Keine zu kühlen Temperaturen während der Blüte
- pH-Wert: 6,5–7,0

Aussaatzeitpunkt:
Ab Ende April (Bodentemperatur > 10°C)

Fruchtfolge:
- Anbaupause von 4 Jahren zu Sklerotinia-Wirtspflanzen
- N-Zehrer als Vor- und Folgefrucht (z. B. Mais, Getreide)

*Der Nachbau von Sojabohnen- und Lupinensaatgut ist gesetzlich nicht zugelassen.

SU Ademira 000 auch in Öko
- ✓ Ertragssieger der Landessortenversuche Bayern 2024
- ✓ Bestnote (BSA-Note 9) in Korn- und Proteinertrag
- ✓ Beste Kombination aus Ertrag und früher Reife
- ✓ Heller Nabel

Acapulca 000/0000 NEU
- ✓ Rekordfrühe Ernte
- ✓ Für Grenzstandorte geeignet
- ✓ Sehr standfest
- ✓ Hoher Proteingehalt und heller Nabel

SU Ademira – bayerische Züchtung auf höchstem Niveau



Quelle: LfL Landessortenversuche Bayern 2024, Kornerträge an normalen Standorten, gemeinsames Sortiment, Versuchsstandorte: Oberhummel und Großaitingen, SU Ademira im Vergleich zu den marktrelevanten Sorten

Sojabohnen

Adelfia 000
- ✓ Mehrjährig hohe Korn- und Proteinerträge
- ✓ Gute Standfestigkeit
- ✓ Rasche Jugendentwicklung

Acassa 000 NEU
- ✓ Deutsche Neuzulassung
- ✓ Frühe Reife
- ✓ Äußerst standfest und kompakter Wuchs
- ✓ Gute Unkrautunterdrückung

Ascada 000
- ✓ Ertragsstarke und standfeste Sorte
- ✓ Sehr gute Verzweigungsleistung
- ✓ Gleichmäßige Abreife

ES Comandor 000 auch in Öko
- ✓ Frühe Abreife in der Reifegruppe (000)
- ✓ Ausgezeichnete Standfestigkeit und heller Nabel
- ✓ Gesunde Sorte mit mittelhohem Hülsenansatz

Sorte	Körner/Einheit	Nabelfarbe	Reifeeinstufung*	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Ertrags- und Qualitätseigenschaften					
								Kornertrag	Ölertrag	Rohproteinertrag	Ölgehalt	Rohproteingehalt	Tausendkorn-masse
SU Ademira auch in Öko	125.000	hell	000	3	5	4	3	9	8	9	5	4	4
Acapulca**	125.000	hell	000/0000	2	2	5	3	6	6	7	5	4	4
Adelfia	125.000	hell	000	3	4	4	3	8	8	8	6	4	4
Ascada	125.000	dunkel	000	3	5	4	3	9	–	–	–	–	4
ES Comandor auch in Öko	125.000	hell	000	3	4	4	3	7	–	7	–	4	4
Acassa	125.000	dunkel	000	3	3	4	2	6	6	5	7	2	3

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025 Deutschland
*Reifeeinstufung nach Sojaförderring
**Züchtereinstufung

Aus der Region – für die Region.
Wir vermehren den größten Teil unserer Sorten selbst und liefern Ihnen dadurch beste Qualität für die Aussaat.

Soja-Saatgut fertig geimpft und sofort bereit zum Säen!

ENSEMO

ENSEMO bringt mit SeedJection das Impfmittel genau dorthin, wo es sein volles Potenzial am besten entfalten kann – ins Sameninnere. Mit der neuen Methode wird das Saatgut ohne Schädigung des Embryos angeschnitten, nützliche Mikroorganismen werden injiziert und der Schlitz mit einem Biopolymer wieder verschlossen.

Vorteile für Sojasaatgut:
- ✓ Impfmittel befindet sich bereits im Saatkorn
- ✓ Weniger Arbeit, da kein Nachimpfen notwendig ist
- ✓ Entfaltet die maximale Wirksamkeit der Rhizobien am Feld
- ✓ Bequem und bereit zur Aussaat



Mehr Infos unter:

Lupinen

Lupine*

Standortansprüche:
- Weiße Lupine = breiteste Standortadaption: pH-Werte bis 7,5; Standorte mit freiem Kalk ungeeignet
- Blaue Lupine: pH-Wert: 5,5–6,8

Aussaatzeitpunkt:
Mitte März bis Anfang April (Bodentemperatur > 6°C)

Fruchtfolge:
- Anbaupausen von 4–6 Jahren zu anderen Leguminosen
- Anspruchslos an die Vorfrucht
- Folgefrucht: Wintergetreide

*Der Nachbau von Sojabohnen- und Lupinensaatgut ist gesetzlich nicht zugelassen.

Celina auch in Öko (weiß/breitblättrig)
- ✓ Überzeugende Korn- und Rohproteinerträge
- ✓ Geringe Lagerneigung
- ✓ Tiefreichende Pfahlwurzel
- ✓ Sehr gute Druscheignung

Bolero (blau/schmalblättrig)
- ✓ Höchsterträge auf leichten Standorten
- ✓ Frühe Reife und kurzer Wuchs
- ✓ Sehr geringe Platzanfälligkeit der Hülsen
- ✓ Hohe Anbausicherheit

Boregine auch in Öko (blau/schmalblättrig)
- ✓ Herausragende Ertragsleistung auf mittleren Standorten und gute bis sehr gute Erträge auf leichten Standorten
- ✓ Hohe Eiweißerträge
- ✓ Gute Standfestigkeit trotz höherem Wuchs

Sorte	Bitterstoffgehalt	Determinierter Wuchs	Blütenfarbe	Ornamentierung des Korns	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	TKM	Kornertrag	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt
Celina auch in Öko	1	1	2	1	3	4	5	3	7	6	7	3
Bolero	1	1	3	4	3	5	3	6	6	7	6	5
Boregine auch in Öko	1	1	1	1	3	5	4	5	6	7	6	5

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025 Deutschland

Ackerbohnen

Ackerbohne

Standortansprüche:
- Schwere bis mittelschwere, tiefgründige Böden
- Auf leichten Böden nur bei ausreichend Grundwasseranschluss

Aussaatzeitpunkt: Sommerackerbohne
Ab Februar bis Ende April

Winterackerbohne
Ende September bis Ende Oktober

Fruchtfolge:
- Anbaupausen von 5–6 Jahren
- N-Zehrer als Vor- und Folgefrucht

GL Alice auch in Öko Winterackerbohne
- ✓ Ertragsstark und winterhart
- ✓ Gesunde Sorte mit hoher Unkrautunterdrückung
- ✓ Rasche Jugendentwicklung

Genius Sommerackerbohne
- ✓ Stabile Gesundheit
- ✓ Hohe Kornerträge
- ✓ Ertragsstabil

Synergy Sommerackerbohne
- ✓ Niedriger Vicin-/Convicingehalt (Human- und Tierernährung)
- ✓ Ertragsstark mit hohem Proteingehalt
- ✓ Gleichmäßige Abreife und gute Standfestigkeit

Sorte	Tanningehalt	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für			TKM	Kornertrag	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt
						Ascochyta	Botrytis	Rost				
GL Alice* auch in Öko	–	5	5	7	5	–	6	4	8	7	7	5
Genius	9	5	5	6	2	5	4	6	6	7	7	3
Synergy	9	5	5	6	2	–	4	5	6	7	8	5

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025 Deutschland
*Beschreibende Sortenliste 2025 Österreich